

SMERNICE ZA CEPLJENJE MAČK

MAČJA KUGA (parvovirus)

NALEZLJIVO VNETJE DIHAL (herpesvirus)

NALEZLJIVO VNETJE DIHAL (calicivirus)



**NUJNO
CEPLJENJE**

1. CEPLJENJE

mladič < 16 tednov

pri 8–9 tednih

po 4 tednih

pri vsaj 16 tednih

mačke > 16 tednov

dva zaporedna odmerka*
v razmiku 3–4 tedne

PONOVITEV CEPLJENJA

po 6–12 mesecih

nato **NE POGOSTEJE*** kot vsake 3 leta
ali preverjanje ravni specifičnih protiteles (parvovirus)

* priporočilo glede na trenutno razpoložljivost cepiv v Sloveniji (december 2020)

STEKLINA

mačke, ki prestopajo državno mejo ali na željo lastnika

1. CEPLJENJE

po 3 mesecih starosti

PONOVITEV CEPLJENJA

po 12 mesecih

nato vsake 3 leta
oz. po navodilih proizvajalca



LEVKOZA (virus FeLV)

mačke, ki so izpostavljene virusu levkoze



OBVEZEN pogoj za cepljenje je negativen izvid hitrega antigenega testa!

V primeru pozitivnega testa

naredimo preiskavo PCR.

1. CEPLJENJE po 8 tednih starosti

ne glede na starost mačke
dva zaporedna odmerka
v razmiku 3–4 tedne

PONOVITEV CEPLJENJA

po 12 mesecih

nato vsake 2–3 leta

Podrobneje



bit.ly/ABCDvacc

ABCD



bit.ly/ISFMvacc

ISFM



bit.ly/WSAVAvacc

WSAVA



Veterinarska zbornica
Slovenije